

漢方薬局 旺樹の杜 女神散料

女神散料は、「勿誤薬室方函」を原典とする、産前産後の神経症、月経不順、血の道症に用いられる漢方薬です。

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください 生後3カ月未満の乳児。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください （1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。（4）胃腸が弱く下痢しやすい人。（5）高齢者。（6）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。（7）次の症状のある人。むくみ （8）次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病 （9）次の医薬品を服用している人。瀉下薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

軟便、下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

体力中等度以上で、のぼせとめまいがあるものの次の諸症：産前産後の神経症、月経不順、血の道症、更年期障害、神経症

<効能・効果に関連する注意>

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる神経不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	トウキ	センキュウ	ビャクジュツ	コウブシ	ケイヒ	オウゴン
分 量	3.0g	3.0g	3.0g	3.0g	2.0g	2.0g

ニンジン	ビンロウジ	オウレン	モッコウ	チョウジ	カンゾウ	ダイオウ
2.0g	2.0g	1.5g	1.5g	0.5g	1.5g	0.5g

用法・用量

本品1包に、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人（15才以上）	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

<用法・用量に関連する注意>

- （1）用法・用量を厳守してください。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （3）1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- （4）煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。（5）本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- （4）煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- （5）生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

その他 医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）