

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

## 漢方薬局 旺樹の杜 立効散料

立効散料は、「蘭室秘蔵」を原典とする、歯痛等に用いられる漢方薬です。

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師、歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。むくみ (5) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状   |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

### 効能・効果

歯痛、抜歯後の疼痛

### 成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | サイシン | ショウマ | カンゾウ | ボウフウ | リュウタン |
|-----|------|------|------|------|-------|
| 分 量 | 2.0g | 2.0g | 1.5g | 2.0g | 1.0g  |

### 用法・用量

本品1包に、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

用法注意事項：本方は口にふくんでゆっくり飲んでください。

| 年 齢    | 大人(15才以上) | 14才～7才 | 6才～4才  | 3才～2才  | 2才未満     | 3カ月未満   |
|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 服用量    | 上記の通り     | 大人の2/3 | 大人の1/2 | 大人の1/3 | 大人の1/4以下 | 服用しないこと |
| 1日服用回数 | 3回        |        |        |        |          |         |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は口に含んでゆっくりのんでください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (5) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (6) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

### その他

医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)