

## 漢方薬局 旺樹の杜 黃連阿膠湯

黄連阿膠湯は、「傷寒論」を原典とする、鼻血、不眠症や皮膚のかゆみに用いられる漢方薬です。

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 生後3ヶ月未満の乳児。
- (2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

下痢

4. 1ヶ月位（鼻血に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

### 効能・効果

体力中等度以下で、冷えやすくのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症：

鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

### 成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	オウレン	オウゴン	シャクヤク
分 量	4.0g	2.0g	2.0g

別包

成 分	アキョウ
分 量	3.0g

### 用法・用量

本品1包に、水約240mLを加えて、80mLぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、添付のアキョウを加えて溶かし、少し冷えてから卵黄1個を入れてかきまぜ、3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3ヶ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (5) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じことがあります。

### その他

医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）